




Precision BioMedicals Co., Ltd.

金准生物医药科技(天津)有限公司



Goat anti-Mouse IgG (H+L), Alexa Fluor 488

货号: 规格:
GM1805 50 μ L
GM1810 100 μ L

【产品介绍】

交叉吸附或预吸附是提高抗体特异性的纯化步骤,从而获得更高的灵敏度和更少的背景染色,提高信噪比。本荧光二抗为了减少交叉反应性,这些山羊抗小鼠 IgG 全抗体已通过人 IgG 和人血清进行交叉吸附处理。

种属反应: 小鼠 偶联物: Alexa Fluor 488

宿主/亚型: 山羊/IgG 分类: 多克隆

浓度: 2 mg/mL


储存条件: 4 $^{\circ}$ C, 避光保存

【应用】

实验应用	建议稀释比
流式细胞分析 (Flow)	1-10 μ g/mL
免疫组化 (IHC)	Assay-dependent
免疫细胞化学 (ICC/IF)	1 μ g/mL

【检测数据】

ICC/IF:



对大鼠小脑神经元细胞的丝状结构进行荧光标记以区分细胞类型。小脑切片首先用神经丝蛋白和胶质纤维酸性蛋白 (GFAP) 的一抗孵育,随后分别使用绿色荧光标记的 Alexa Fluor 488 山羊抗小鼠 IgG 二抗和橙红色荧光标记的 Alexa Fluor 568 山羊抗兔 IgG 二抗进行显色。