




Precision BioMedicals Co., Ltd.

金准生物医药科技(天津)有限公司



Goat anti-Mouse IgG (H+L), Alexa Fluor 594

货号: 规格:
GM2705 50 μ L
GM2710 100 μ L

【产品介绍】

交叉吸附或预吸附是提高抗体特异性的纯化步骤,从而获得更高的灵敏度和更少的背景染色,提高信噪比。本荧光二抗为了减少交叉反应性,这些山羊抗小鼠 IgG 全抗体在偶联前已针对人 IgG 和人血清进行交叉吸附处理

种属反应: 小鼠 偶联物: Alexa Fluor 594

宿主/亚型: 山羊/IgG 分类: 多克隆

浓度: 2 mg/mL


储存条件: 4℃, 避光保存

【应用】

实验应用	建议稀释比
流式细胞分析 (Flow)	1-10 μ g/mL
免疫组化 (IHC)	Assay-dependent
免疫细胞化学 (ICC/IF)	1-10 μ g/mL

【检测数据】

ICC/IF:



人 iPSCs 在无饲养层条件下,使用 StemPro hESC 培养基于玻片上培养。细胞固定与透化处理采用 Image-iT 固定/透化试剂盒。Oct4 (绿色荧光) 表达通过抗 Oct4 一抗与 Alexa Fluor 488 标记二抗显示,微管蛋白 (红色荧光) 表达采用抗微管蛋白一抗与 Alexa Fluor 594 标记二抗呈现,细胞核 (蓝色荧光) 使用 NucBlue 固定细胞核染色剂标记。图像采集在 FLoid 细胞成像工作站上完成。