Goat anti-Rabbit IgG (H+L), Alexa Fluor 594

货号：	规格：
GRB2705	50 μL
GRB2710	100 μL

【产品介绍】

交叉吸附或预吸附是提高抗体特异性的纯化步骤，从而获得更高的灵敏度和更少的背景染色，提高信噪比。本荧光二抗为了减少交叉反应性，这些山羊抗兔 IgG 全抗体已被亲和纯化，并对人 IgG、人血清、小鼠 IgG、小鼠血清及牛血清进行交叉吸附处理。

种属反应： 兔　　**偶联物：** Alexa Fluor 594

宿主/亚型： 山羊/IgG　　**分类：** 多克隆

浓度： 2 mg/mL

储存条件： 4℃，避光保存

【应用】

实验应用	建议稀释比
流式细胞分析 (Flow)	1-10 μg/mL
免疫细胞化学 (ICC/IF)	2 μg/mL

【检测数据】

ICC/IF：



野生型（Canton-S 品系）黑腹果蝇胚胎外周神经系统标记实验：采用 22c10 单克隆抗体（特异性识别微管相关蛋白）进行初孵育，后使用绿色荧光标记的 Alexa Fluor 488 兔抗小鼠 IgG 二抗显色。发育中齿状带的活跃分裂细胞通过兔源抗组蛋白 H3 抗体标记，并采用红色荧光标记的 Alexa Fluor 594 山羊抗兔 IgG 二抗呈现。中枢神经系统富集的细胞核最终采用蓝色荧光 DAPI 复染。